

第三堂課學習資源#2
特殊照護項目

標題	內容	對應素材 (影像/圖片或其他相關資料)
01.靜脈注射、肌肉注射、皮內注射、皮下注射、點滴加藥　　靜脈注射	**靜脈注射**: 靜脈注射是一種醫療方法，即把血液、藥液、營養液等液體物質直接注射到靜脈中。靜脈注射可分短暫性與連續性，短暫性的靜脈注射多以針筒直接注入靜脈；連續性的靜脈注射則以靜脈滴注實施，俗稱「(打）點滴」，為將留置針插入靜脈後固定，然後接上可更換或補充的瓶裝或袋裝醫療液體。 **肌肉注射**: 指將藥液通過注射器注入肌肉組織內，達到治病的目的。 **皮內注射**:將小量藥液輸入表皮與真皮之間的方法。 **皮下注射**:將小量藥液輸入皮下組織的方法，例如胰島素注射。 **點滴加藥**:於大量輸液中加入藥物，以連續性的靜脈滴注方式給予藥物。	
02. 中心靜脈營養導管護理	指個案無法由口進食、鼻胃管或腸造廔攝取營養時，藉由中心靜脈注射，將高濃度營養液注射入體內，以提供身體所需的熱量及營養物質，由護理人員所提供之導管護理。	
03.插入（更換）鼻胃管或胃造口管護理	插入(更換)鼻胃管:指個案可能因疾病影響，無法由口進食，將鼻胃管經由鼻腔插入至胃內，提供所需營養；平常由家屬清潔鼻胃管周圍之皮膚並換黏貼膠布；另定期由居家護理師至家中更換鼻胃管及相關照護。 胃造口管: 經皮內視鏡胃造口術是在 1980 年由 Gauderer 等學者所研發出來的。在腹壁上鑽個小洞，再經由胃鏡放置一條貫穿胃前壁的管路。	
04.氣切護理（更換氣切造口管、氣切造瘻口處理）	指在個案氣管切開造口作為人口呼吸道，維持個案呼吸道通暢；平常由家屬清潔氣切口及換紗布；另定期會有居家護理師至家中更換氣切造口管及護理。	
05.更換膀胱造口管	為協助因尿道阻塞、無法存放留置導尿管的個案或為增進傷口癒合而需使尿路改道的個案，藉由腹部超音波的導引，將導管直接插入膀胱，引流尿液。平常由家屬清潔膀胱造口及換紗布；另定期會有居家護理師至家中更	

	換膀胱造口管及護理。	
06.留置導尿管護理（含尿袋、小腿尿袋使用）	指個案無法自行排尿，需經由尿道口，插入導尿管接上尿袋，幫助尿液排出；此指針對留置導尿管的護理。	
07.大小量灌腸、留置性灌腸	將一定量的溶液通過肛管，由肛門經直腸灌入結腸，以幫助個案排便、排氣。也可借輸入的藥物，達到確定診斷和進行治療的目的。	
08.糞嵌塞清除	乾燥的糞塊堵塞直腸不能排出，引起嚴重的便秘癥狀和會陰部疼痛，成為糞嵌塞。處理方法通常塞入栓劑或微型灌腸劑，之後等待約 15-20 分鐘，讓刺激劑起作用。等待期結束後，每 10-15 分鐘用手指刺激，直到直腸排空。那些腸弛緩的患者通常省略塞入栓劑或微型灌腸劑步驟，直接用手指刺激或手工清除。	
09.造口護理(含造口灌洗)	(1) 造廔口：指個案罹患消化系統疾病、泌尿系統疾病或外傷所致，藉由外科手術在腹部或下腹部形成造廔口。 (2) 包含有：胃造廔口、腸造廔口、腎臟造廔口或膀胱造廔口。 腸造廔口：俗稱人工肛門，將排便的出口由肛門改在腹壁上，作為排便之用。 膀胱造廔口：俗稱人工膀胱；個案因泌尿疾病所致，在下腹部（即恥骨上）做一個造口，作為排尿。 造口灌洗術:例如結腸造口灌洗術主要目的是以灌腸的方法利用重力及虹吸的原理充分的擴張腸道刺激腸蠕動，排出腸內之糞便及氣體，養成排便的習慣。教導個案可自行選擇每天固定的時間、用一定的水量做結腸造口灌洗，讓結腸內糞便盡量排淨。	 
10. 抽痰(含蒸氣吸入)	抽痰:指清除個案呼吸道（口、鼻、咽喉、氣管）之分泌物，可以促進呼吸道通暢，可避免肺炎產生。 蒸氣吸入: 是用專門的霧化裝置，將藥物溶液霧化成微小顆粒順利吸入呼吸道，可治療呼吸系統之不適症狀。	

11.氧氣治療	指個案依醫師指示，在家中使用氧氣，以減輕呼吸困難等目的。家中可能備有氧氣濃縮機或氧氣鋼瓶（如左圖）且目前個案仍有在使用氧氣設備者。	 氧氣濃縮機  氧氣鋼瓶
12.血氧濃度測量	血氧濃度可代表心肺能力是否正常，主要用於呼吸治療的個案，測量血中氧氣濃度是否足夠。	
13.壓瘡處理(三級以上壓瘡傷口處理)	壓瘡指因長期受壓所造成之傷口，發生在薦椎處、股骨頭、腳跟等骨頭較突出處；平常需要換藥。 圖片來源：載自台大醫院壓瘡小組製作「壓瘡分期與處理」之單張	
14.傷口護理、換藥（不包括三、四級壓瘡傷口處理）	指傷口評估、傷口換藥等。	
15.一般導尿、尿管護理	指經由尿道插入導尿管到膀胱，引流出尿液。導尿分為導管留置性導尿及間歇性導尿二種。前者導尿管一直留置在個案體內，在病情許可時才拔掉或定期更換新管子。後者則每隔 4-6 小時導尿一次，在膀胱排空後即將導尿管拔出。	
16.引流管灌洗	引流管灌洗係經醫師指示經由引流管輸注清洗液或藥劑，清除腔室內的沉澱物及治療，以維持引流管系統的通暢及達治療之目的。	
17.更換腎臟引流或膀胱引流管	引流管功用為術後引流血水、分泌物，將腔室內積存液體排出，降低感染率，避免壓迫及刺激周圍皮膚組織，以促進傷口癒合。	
18.被動性關節	被動性關節運動是指個案本人不施力，而由治療人員或儀器帶動患者關節之運動。此指經由專業人員教導照顧	

運動	者為個案進行被動性關節運動相關衛教。	
19.管灌餵食	指經鼻胃管、鼻腸管或胃造口灌食。	
20.呼吸器	指由氣切口或口鼻部插管，外接呼吸器，以協助個案呼吸的機器。	
21.疼痛處置	指協助控制因疾病引起的疼痛緩解之相關處置。	